

Acard 150 mg x 60 tabl. dojelit.

Cena: 25,70 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wstęp

Acard jest produktem leczniczym zawierającym hamujący zlepianie się płytek krwi kwas acetylosalicylowy.

Skład

Substancja czynna leku: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletkę dojelitową zawiera 150 mg kwas acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, otoczka: hypromeloza, acryl Eze-White: 10, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, symetykon emulsja.

Działanie:

Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy, hamuje zlepianie się płytek krwi.

Wskazania:

Długotrwałe, profilaktyczne stosowanie w chorobach, grożących powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie:

Lek stosować zawsze dokładnie jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się dawkowanie: 1 tabletkę na dobę.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.

Aby przyspieszyć wchłanianie, tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Acard 150 mg w przypadku

- uczulenia na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- zwiększonej skłonności do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
- choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy;
- ciężkich chorób nerek, wątroby lub serca (ciężką niewydolność);
- występujących w przeszłości napadów astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy ; duszność, świszczący oddech);
- dny moczanowej;
- wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);
- stosowania metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować leku Acard 150 mg przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym również przed niewielkimi zabiegami np. usunięcie zęba.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.

Lek Acard 150 mg zawiera sól.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Polfa Warszawa S.A.,
ul. Karolkowa 22/24,
01-207 Warszawa

Składniki

Acetylsalicylic Acid

Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Znaczna część podanych poniżej ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczy kwasu acetylosalicylowego stosowanego w dawkach konwencjonalnych, tj. od 1g do 3g na dobę i wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne przy stosowaniu małych dawek produktu. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu, który może wpływać na działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dla Acard również u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej). Kwas acetylosalicylowy może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczynny skórny, świąd, pokrzywka) na inne substancje. U pacjentów ze zwiększoną skłonnością do

krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny lub heparynę – z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach) zastosowanie kwasu acetylosalicylowego należy rozważyć, uwzględniając stosunek ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Należy rozważyć stosowanie produktu leczniczego u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, ponieważ może się uczynnić choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt leczniczy może wywołać napad dny moczanowej. Acard 75mg lub Acard 150 mg zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Acard 150 mg x 60 tabl. dojelit.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Acard
Aspirin acetylosalicylicum

LEK

DZIAŁANIE

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

Acard przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.*

* Na podstawie: Ulotka dołączona do opakowania ACARD: Informacja dla pacjenta.

Acard
Aspirin acetylosalicylicum

LEK

WSKAZANIA

- w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
- w świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawałowi serca;
- w niestabilnej chorobie wieńcowej;
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyni wieńcowych;

Acard
Aspirin acetylosalicylicum

LEK

WSKAZANIA

- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebiegu;
- u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
- w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
- w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwałe unieruchomionych.

Acard
Aspirin acetylosalicylicum

LEK

STOSOWANIE

Wystarczy jedna tabletkę na dobę*

Tabletka dojelitowa posiada otoczkę i nie rozpada się w żołądku, dzięki czemu nie podrażnia błony śluzowej żołądka.

- Przyjmować po posiłku
- Połykać w całości
- Popić niewielką ilością wody

*Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.

Acard
Aspirin acetylosalicylicum

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ



ACARD/892/06-2022