

Acard 75 mg x 60 tabl. dojelit.

Cena: 15,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,075 g
Opakowanie	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)
Postać	tabl.dojelit.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wstęp

Acard to produkt leczniczy zawierający hamujący zlepianie się płytek krwi kwas acetylosalicylowy.

Skład:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

1 tabletkę zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, Otoczka: hypromeloza, acryl Eze-White: kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

Działanie:

Zawarty w leku kwas acetylosalicylowy, hamuje zlepianie się płytek krwi.

Dawkowanie:

Lek stosować zawsze dokładnie jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zwykle zaleca się dawkowanie: 1 tabletkę na dobę.

W świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe.

Aby przyspieszyć wchłanianie, tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć.

Wskazania:

Profilaktyczne, długotrwałe stosowanie w chorobach, których przebieg grozi powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Acard 75 mg w przypadku

- stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną leku - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik;
- skazy krwotocznej;
- czynnej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy;
- ciężkiej niewydolności nerek;
- ciężkiej niewydolności wątroby;
- napadów tzw. astmy aspirynowej i były wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- bycia w ostatnim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek Acard 150 mg zawiera sód.

Nie stosować leku Acard 75 mg przez co najmniej 5 dni przed zaplanowanym zabiegiem chirurgicznym (także takim jak usunięcie zęba).

Leku Acard nie stosować jednocześnie metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych i ibuprofenem.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Polfa Warszawa S.A.,
ul. Karolkowa 22/24,
01-207 Warszawa

Składniki

Acetylsalicylic Acid

Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Znaczna część podanych poniżej ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczy kwasu acetylosalicylowego stosowanego w dawkach konwencjonalnych, tj. od 1 g do 3 g na dobę i wystąpienie tych reakcji jest mało prawdopodobne przy stosowaniu małych dawek produktu. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu, który może wpływać na działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek, u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyn skóry, świąd, pokrzywka) na inne substancje. U pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (hemofilia, niedobór witaminy K), przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (np. pochodne kumaryny lub heparynę – z wyjątkiem leczenia heparyną w małych dawkach) zastosowanie kwasu acetylosalicylowego należy rozważyć, uwzględniając stosunek ryzyka do korzyści. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Należy rozważyć stosowanie produktu leczniczego u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, ponieważ może się uczynić choroba wrzodowa oraz mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego. Kwas acetylosalicylowy, ze względu na działanie antyagregacyjne, może powodować wydłużenie czasu krwawienia podczas lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z

niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego na 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza okulistycznym i otologicznym. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt leczniczy może wywołać napad dny moczanowej. Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Acard 75 mg x 60 tabl. dojelit.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Acard LEK

DZIAŁANIE

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.

Acard przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.*

* Na podstawie: Ulotka dołączona do opakowania ACARD: Informacja dla pacjenta.

Acard LEK

WSKAZANIA

- w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
- w świeżym zawał serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
- w niestabilnej chorobie wieńcowej;
- w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
- po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczępieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;

Acard LEK

WSKAZANIA

- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebiegu;
- u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
- w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
- w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwanie unieruchomionych.

Acard LEK

Wystarczy jedna tabletką na dobę*

Tabletkę dojelitową posiada otoczkę i nie rozpada się w żołądku, dzięki czemu nie podrażnia błony śluzowej żołądka.

- Przyjmować po posiłku
- Połykać w całości
- Popić niewielką ilością wody

* Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz okresy czas stosowania.

Acard LEK

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ



ACARD/884/05-202