

## Acidolit (jabłko) proszek do przyg. rozt. doust. x 10 sasz.



Cena: 26,88 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 sasz. po 4,4 g
Postać	prosz.do sporz.roztw.doust.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wstęp

Proszek do przygotowania roztworu doustnego o smaku jabłkowym do stosowania u niemowląt, dzieci lub osób dorosłych. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Preparat stosuje się w celu uzupełniania płynów i składników mineralnych zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Zapewnia organizmowi ochronę przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

#### Składniki:

glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny

Składnik	[mmol/litr]	w 100 g	w 1 saszetce/ w [mg/200 ml] roztworu
Sód	60	6 360 mg	279,84 mg
Chlorki	50	8 180 mg	359,92 mg
Glukoza	85	70 450 m	3 099,8 mg
Potas	20	3 640 mg	160,16 mg
Cytrynian	10	8 640 mg	380,16 mg
Osmolarność [mOsm/l]	225	-	-

Wartość odżywcza i energetyczna	w 100 g	w 1 saszetce/ w 200 ml roztworu
Wartość energetyczna (energia)	1328 kJ (312 kcal)	58 kJ (14 kcal)
Węglowodany	71 g	3 g
- w tym cukry (glukoza)	71 g	3 g
- skrobia	0,9 g	0 g
Sól	15,9 g	0,7 g

**Sposób przygotowania:**

Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać.

Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem.

Roztworu nie dosładzać. W przypadku występowania wymiotów płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

**Porcja preparatu Acidolit® proponowana do spożycia według wagi dziecka**

Do 4 kg: 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

4 - 8 kg: 50 - 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

8 - 12 kg: 100 - 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Powyżej 12 kg: 100 - 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Acidolit® może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.

Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

**Środki ostrożności:**

Nie spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Preparat zawiera znikome ilości tłuszczu, błonnika i białka.

**Ostrzeżenia:**

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze od 15 do 25 . Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Opakowanie:** 10 saszetek po 4,4 g

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

**Składniki**

Citric Acid

**Stosowanie**

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Producent**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

**Opis**

Acidolit (jabłko) proszek do przyg. rozt. doust. x 10 sasz.