ALERIC DESLO ACTIVE tabletki rozpadające się w jamie ustnej 2,5 mg, 10 tbl

Cena: 17,43 zł

Opis słownikowy

Dawka	2,5 mg
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.uleg.rozpad.w j.ust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum

Opis produktu

ALERIC DESLO ACTIVE to produkt leczniczy w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, który dzięki zawartości substancji czynnej - desloratadyny łagodzi objawy alergii, zmniejsza kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie i koi świąd skóry w pokrzywce u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6-11 lat.

Skład:
Substancja czynna: Desloratadyna, 2,5 mg w 1 tabletce
Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Wskazania:
Produkt leczniczy Aleric Deslo Active jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 6 do11 lat w celu łagodzenia objawów związanych z
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
- pokrzywką

Dawkowanie:
Dzieci w wieku 6 do 11 lat: jedną tabletkę produktu leczniczego Aleric Deslo Active umieścić w jamie ustnej raz na dobę w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie tabletki produktu leczniczego Aleric Deslo Active umieścić w jamie ustnej raz na dobę, w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta.

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki desloratadyną bez konsultacji z lekarzem powinno trwać nie dłużej niż 10 dni

Sposób podania:
Blister ostrożnie rozerwać bezpośrednio przed użyciem i wyjąć tabletkę bez kruszenia.
Tabletkę umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega on natychmiastowemu rozpadowi. Nie są potrzebne woda lub inny płyn aby połknąć dawkę.
Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną lub na loratadynę.

Opakowanie: 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 20562

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40, 50–507 Wrocław

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.