

Alugastrin Dihydroxyaluminii natrii carbonas 1,02 g/15 ml Lek o smaku miętowym 250 ml



Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,02 g/15ml
Opakowanie	250 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dihydroxyaluminii natrii carbonas

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

łagodzi dolegliwości bólowe związane z nadkwaśnością soku żołądkowego, osłania przełyk i żołądek

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Okres ważności po otwarciu: 30 dni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Producent

URGO Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

250

Opis

Alugastrin Dihydroxyaluminii natrii carbonas 1,02 g/15 ml Lek o smaku miętowym 250 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

Alugastrin®
PODWÓJNE DZIAŁANIE:

szybko usuwa zgagę



osłania żołądek przed podrażnieniami

DZIAŁANIE:

Alugastrin®

- > Zobojętnia nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym.
- > Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy.
- > Łagodzi dolegliwości bólowe związane z nadkwaśnością soku żołądkowego.



WSKAZANIA:

Do stosowania objawowo:

- > w nadkwaśności soku żołądkowego;
- > w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne);
- > w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

DAWKOWANIE:



- > 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.
- > Butelkę wstrząsać przed użyciem.
- > Od 6. roku życia.



Poczuj ulgę.
Zapewnij ochronę.

Nr 1
ZAWIESINA NA ZGAGĘ
NA RYNKU*



*DANE GŁÓWNE

Alugastrin®

Alugastrin, 1,02 g / 15 ml, zawiesina doustna. Lek OTC. Skład: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksylowo-sodowego węgla. Substancje pomocnicze o znaczeniu dla alergii: sorbitol, metylu parahydroksybenzoesian, propylu parahydroksybenzoesian. Wskazania: Objawy w nadkwaśności soku żołądkowego; w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek, podmiotłoczenie. Laboratoria Hoffa-Lodź Sp. z o.o.

ALLEGORNIENKOZI 20201

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.