

Aspirin C Tabletki musujące 10 tabletek

Cena: 25,60 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,4g+0,24g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum

Opis produktu

Wstęp

Opis produktu

(Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum)
400 mg + 240 mg, tabletki musujące

Skład:

1 tabletkę zawiera jako substancje czynne 400 mg kwasu acetylsalicylowego i 240 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze. Lek zawiera sól - patrz ulotka.

Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy, tj.:

- gorączka
- ból głowy
- bóle mięśniowe

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/1928

Przygotowanie i stosowanie

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Opakowanie zawiera: 10 tabletek musujących

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wskazania

Z witaminą C

Składniki

1 tabletkę zawiera jako substancje czynne 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze

Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty.

Dorośli: od 1 do 2 tabletek musujących.

W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 tabletkę.

W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci poniżej 12. roku życia leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12. roku życia leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Opis

Aspirin C Tabletki musujące 10 tabletek

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

