

# Aspirin Pro Tabletki powlekane 20 tabletek

Cena: 26,50 zł



## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

## Opis produktu

### Wstęp

#### Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. Tylko do podawania doustnego.

Dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia: jednorazowo 1 tabletkę. W razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku bardziej nasilonej gorączki lub bólu zalecana pojedyncza dawka wynosi 2 tabletki, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Dorośli w podeszłym wieku (65 lat i więcej): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę tę można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 4 tabletki.

Młodzież w wieku 12-15 lat (u osób o masie ciała 40-50 kg): jednorazowo 1 tabletkę, w razie potrzeby dawkę taką można przyjąć ponownie po upływie co najmniej 4 godzin. Łączna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek.

Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 dni (w przypadku gorączki) lub 3-4 dni (w przypadku bólu), chyba że lekarz zaleci inaczej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Aspirin Pro u dzieci poniżej 12. roku życia.

#### Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

**Przeciwwskazania**

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Producent**

Bayer Sp. z o.o.

**Ważne**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**Opis**

Aspirin Pro Tabletki powlekane 20 tabletek

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



Idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie szybkość działania leku i wygodę stosowania.

Stosowana na:

- Gorączkę
- Ból
- Stan zapalny

Zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego o działaniu

przeciwzapalnym  
 przeciwbólowym  
 przeciwgorączkowym

Unikalna technologia Microactive®

6x szybsze uwalnianie\*

2x szybszy efekt\*\*

2,5x szybsze wchłanianie\*\*

\* W porównaniu z tabletkami Aspirin® 0,5 g.  
 \*\* W porównaniu z tabletkami Aspirin® 500mg, zgodnie z CHPL.

Powlekana tabletką z musującym rdzeniem,

nie rozpada się od razu w ustach, ale dopiero po połknięciu

Każda z tabletek powlekanych jest osobno zapakowana

i z łatwością daje się oddzielić od pozostałych.

Zwalcza ból szybciej niż kiedykolwiek

**Dorośli i młodzież**  
 - powyżej 16 lat  
 - Max. 6 tabletek na dobę  
 1-2 x (co min. 4h)

**Osoby starsze (65+)**  
 - Max. 4 tabletki na dobę  
 1 x (co min. 4h)

**Młodzież**  
 - 12-15 lat  
 - Max. 6 tabletek na dobę  
 1 x (co min. 4h)

**Ból, gorączka, stany zapalne**

**20 tabletek**