

Aspirin Tabletki 10 tabletek

Cena: 12,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	10 tabl. (karton)
Postać	tabl.
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wstęp Opis

Lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, wydawany bez recepty - OTC.

(Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki

Działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwgorączkowe
- przeciwbólowe

Skład:

1 tabletki zawiera jako substancję czynną 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze.

Wskazania:

bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka.

Dawkowanie:

Dorośli - jednorazowo 1-2 tabletki.

Młodzie w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza - jednorazowo 1 tabletki.
Popiś duŹ iloŹci pŹynu. Nie zaŹywaŹ na czczo.

Szczegółowe informacje dotyczŹce dawkowania w ulotce doŹczonej do opakowania.

Podanie doustne.

Przed zastosowaniem naleŹy zapoznaŹ siŹ z treŹciŹ ulotki.

Przechowywanie

Lek przechowywaŹ w temperaturze poniŹej 30°C w miejscu niewidocznym i niedostŹpnym dla dzieci.

ZawartoŹ opakowania: 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Stosowanie

Ten lek naleŹy zawsze stosowaŹ dokłaďnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedłŹg zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwoŹci naleŹy zwróciŹ siŹ do lekarza lub farmaceuty.

DoroŹli: Doustnie jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie koniecznoŹci, dawka jednorazowa moŹe byŹ powtarzana co 4-8 godzin. Nie naleŹy przekraczaŹ

maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 8 tabletek.

Młodzie w wieku powyŹej 12 lat: Produkt moŹe byŹ stosowany u młodzieŹy powyŹej 12. roku Źycia wyłŹcznie na zlecenie lekarza.

Doustnie jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

- Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłkach, z dużą ilością płynu.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować leku u dzieci poniżej 12. roku życia. U młodzieży powyżej 12 lat leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Opis

Aspirin Tabletki 10 tabletek

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

