

# Bionorica Mastodynon Tabletki 60 Pieces

Cena: 57,29 zł



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl. (3 blist. po 20 tabl.)
Postać	tabl.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

## Opis produktu

### Wstęp

### Wskazania

Zmniejsza obrzęk i bolesność piersi (1), Łagodzi zaburzenia równowagi emocjonalnej (2), Unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego (3), 1) Halaska M., Beles P., Gorkow C., Seider C.: Treatment of cyclical mastalgia with solution containing Vitex agnus-castus extract: result of placebo-controlled double-blind study. Breast 1999; 8: 175-181. 2) Liebl A., Behandlung des prämenstruellen Syndroms (Treatment of the premenstrual syndrome). Agnus-castus- heltiges Kombination-sarzneimittel im Test. TW Gynäkologie 1992; 147-154. 3) Charakterystyka Produktu Leczniczego Mastodynon®.

### Składniki

1 tabletkę zawiera: substancje czynne: Vitex agnus-castus TM 162,0 mg, Caulophyllum thalictroides D4 81,0 mg, Cyclamen purpurascens D4 81, 0 mg, Strychnos ignatii D6 81,0 mg, Iris versicolor D2 162,0 mg, Lilium lancifolium D3 81, 0 mg, Lek zawiera laktozę

### Stosowanie

Dawkowanie i sposób podawania: Dorosłe kobiety: doustnie, 1 tabletkę dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Lek można popić (np. szklanką wody). Mastodynon nie powinien być stosowany u pacjentek, które nie rozpoczęły jeszcze regularnego miesiączkowania w okresie pokwitania. Lek należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także w trakcie menstruacji. Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania leku dolegliwości będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### Przeciwwskazania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Producent**

Bionorica Polska Sp. z o.o.

**Opis**

Bionorica Mastodynon Tabletki 60 Pieces

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.