

Bionorica Sinupret Tabletki drażowane 100 sztuk

Cena: 89,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 draż. (4 blist. po 25 draż)
Postać	tabl.draż.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

Rozrzedza zalegającą wydzielinę (1,2), Odtyka nos i zatoki (1,2), Pozwala swobodnie oddychać (1,2), 1. Neubauer, März Placebo-controlled, randomized, double-blind clinical trial with Sinupret sugar-coated tablets on the basis of a therapy with antibiotics and decongestant nasal drops in acute sinusitis. Phytomedicine 3, 1994, 177-181. 2. März R.W., Ismail C., Popp M.A.: Action profile and efficacy of a herbal combination preparation for the treatment of sinusitis. Wien Med Wochenschr 1999; 149: 202-208

Składniki

Jedna tabletkę drażowaną zawiera: 6 mg *Gentiana lutea radix* (korzeń goryczki), 18 mg *Primulae flos cum calycibus* (kwiat pierwiosnka z kielichem), 18 mg *Rumicis herba* (ziele szczawiu), 18 mg *Sambucus nigra flos* (kwiat bzu czarnego), 18 mg *Verbenae herba* (ziele werbeny), Lek zawiera m. in.: laktozę jednowodną, sorbitol, sacharozę, glukozę

Stosowanie

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat : doustnie po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat: doustnie 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie. Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Podczas stosowania leku Sinupret podobnie jak innych leków o działaniu sekretolitycznym, zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

BIONORICA SE

Opis

Bionorica Sinupret Tabletki drażowane 100 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.