

# Clotrimazolum GSK krem 10 mg/g, 20 g

Cena: 7,50 zł



## Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	20 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Clotrimazolum

## Opis produktu

Clotrimazolum GSK w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Zawiera substancję czynną klotrymazol należącą do pochodnych imidazolu, która zabija większość grzybów wywołujących zakażenia u człowieka. Lek działa na dermatofity i drożdżaki.

**Skład:**  
Substancja czynna: klotrymazol. 1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.  
Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, oktylododekalon, polisorbata 60, sorbitanu stearynian, olbrot, syntetyczny, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

**Wskazania:**  
Lek wskazany jest do miejscowego leczenia:  
- grzybic skóry rąk, stóp, tułowia, podudzi, nóg wywołanych przez dermatofity  
- łupieżu pstrego  
- zakażeń skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych, napletka, żołądź), wywołanych przez drożdżaki (zakażenia te nazywane są także kandydozami).

**Dawkowanie:**  
Krem nakładać cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca 2 lub 3 razy na dobę.  
Stosować na wszystkie zakażone miejsca jednocześnie.

**Czas trwania leczenia:**  
Lek należy stosować przez okres 2-4 tygodni, nawet jeśli objawy choroby ustępują. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotom zakażenia.  
Jeśli objawy nasila się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy ponownie zgłosić się do lekarza.

**Przeciwwskazania:**  
Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Leku nie zaleca się stosować w okolicach oczu. Nie połykać.

Należy jednocześnie leczyć wszystkie obszary, które mogą być objęte chorobą.

Dzieci w wieku do 11 lat i osoby w podeszłym wieku mogą stosować lek tylko na zlecenie lekarza.

**Opakowanie:** 20 g

Podmiot odpowiedzialny  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  
ul. Grunwaldzka 189  
60-322 Poznań

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**