

Debutir 300 mg x 10 czop. doodbyt.

Cena: 28,20 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 czop.
Postać	czop.doodbyt.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Debutir® czopki to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania doodbytniczego do stosowania wspomagająco w regeneracji w obrębie błony śluzowej odbytnicy.

Czopek wprowadza się do kanału odbytu, gdzie po zetknięciu ze śluzem wytwarzanym fizjologicznie przez komórki kubkowe błony śluzowej odbytu, wytwarza na powierzchni błony śluzowej ochronną powłokę o właściwościach mukoadhezyjnych. Stanowi to ochronę oraz poprawia nawilżenie błony śluzowej odbytu.

Skład:

1 czopek doodbytniczy Debutir® o masie 2 g zawiera: maślan sodu, alginian sodu, karboksymetylocelulozę, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

Stosowanie:

Bezpośrednio przed zastosowaniem otworzyć blister czopka poprzez oderwanie folię wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii. Odstąpić czopek i ostrożnie wyjąć go z blistra. Czopka nie należy wydobywać poprzez wyciskanie.

Sposób użycia:

Przed aplikacją wyrobu umyć i osuszyć ręce. Czopek ostrożnie umieścić w kanale odbytu.

Wprowadzenie czopka do odbytu najwygodniej jest wykonać w pozycji bocznej, leżącej, z lekko podkurczonymi nogami.

Zaleca się aplikację czopka na noc.

Po użyciu produktu, należy umyć ręce.

Czopki doodbytnicze można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu w porozumieniu z lekarzem może być kontynuowane do 10 dni. Zaleca się stosować jeden czopek na dobę. Przerwa pomiędzy pierwszą a kolejną aplikacją czopka nie powinna być krótsza niż 24 godziny.

Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład czopków
- silny, ostry ból okolicy odbytu
- zmiany nowotworowe odbytnicy
- krwawienie z odbytnicy samoistne lub przy wypróżnianiu, rozumiane jako występowanie jasnoczerwonej krwi na stolcu

W przypadku krwawienia z odbytnicy, silnego bólu okolicy odbytu lub zmian nowotworowych odbytnicy wyrób medyczny Debutir czopki doodbytnicze może być stosowany tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarskie.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15 - 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłem ciepła, wilgocią. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu. Nie stosować wyrobu, jeśli przed pierwszym otwarciem opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.

Opakowanie: 2 blistry po 5 czopków (10 czopków)

Składniki

Butanoic Acid

Stosowanie

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Debutir 300 mg x 10 czop. doodbyt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

10 czopków



**WSPOMAGAJĄ REGENERACJĘ
BŁONY ŚLIZOWEJ ODBYTNICY**



**czopki z maślanem
sodu 300 mg**

**Debutir® czopki może łagodzić
objawy oraz przebieg choroby
u pacjentów ze stanami takimi jak:**

- hemoroidy
- śwід odbytu
- zapalenie odbytu
- popromienne
zapalenie odbytnicy
- wrzodziejące
zapalenie jelita
grubego
- choroba
Leśniowskiego
-Crohna*

*z zajęciem odbytu (odbytnicy i/lub
przetokami/szczeliną odbytu



- +
 Chroni i nawilża- +
 Odtwarza naturalny stan
fizjologiczny błony śluzowej

- +
 Wspomaga regenerację
nadżerek i pęknięć- +
 Łagodzi objawy bolesnego
wyróżniania**- +
 Regeneruje tkanki po
zabiegach chirurgicznych
lub radioterapii.

** związane z uszkodzeniem nabłonka lub istnieniem
procesu zapalnego w odbytnicy

STOSOWANIE PRODUKTU¹

1 x 24h



Aplikacja doodbytnicza.

1. PIL wyrob medyczny Debutir® czopki.