

## Famotydyna Ranigast 20 mg x 20 tabl. powl.

Cena: 20,90 zł



### Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Famotidinum

### Opis produktu

#### Wstęp

Famotydyna Ranigast zawiera należącą do grupy leków nazywanych antagonistami receptora  $H_2$  famotydynę, która hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność.

Działanie leku utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

#### Skład:

Substancja czynna leku: famotydyna. Każda tabletkę zawiera 20 mg famotydyny.

#### Pozostałe składniki leku:

Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwieni koszenilową (E124)

#### Wskazania:

Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność.

#### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

**Dorośli:**

W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki).

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:**

Ze względu na to, że lek jest wydalany głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż może okazać się konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 godzin.

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek.

**Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:**

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

**Stosowanie u dzieci i młodzieży:**

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zaobserwowano nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie.

Niewydolność nerek.

**Przechowywanie:**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

**Opakowanie:** 20 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Składniki**

Famotidine

**Stosowanie**

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Przeciwwskazania**

Leczenie antagonistami receptora histaminowego H2, w tym m.in. famotydyną, może maskować objawy raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. nawracających wymiotów, wymiotów krwistych lub smolistych stolców) należy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć obecność zmian nowotworowych. Zaleca się także zasięgnięcie porady lekarza przed przyjęciem produktu Famotydyna Ranigast przez następujących pacjentów: pacjenci w średnim

wieku lub w podeszłym wieku z objawami niestrawności, które wystąpiły po raz pierwszy lub u których objawy te uległy zmianie w ostatnim czasie; pacjenci z trudnościami z przełykaniem, długotrwałym bólem brzucha lub niezamierzoną utratą masy ciała w połączeniu z objawami niestrawności. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 14 dniach leczenia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Famotydyna nie jest odpowiednia dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek pozostających bez opieki medycznej. Famotydyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu u dzieci nie zostały zbadane. Podczas podawania famotydyzny pacjentom w podeszłym wieku w trakcie badań klinicznych nie obserwowano wzrostu częstości występowania lub zmiany rodzaju działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. Nie jest wymagana modyfikacja dawki tylko ze względu na wiek. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej produkt może powodować reakcje alergiczne.

### Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

### Opis

Famotydyna Ranigast 20 mg x 20 tabl. powł.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Galeria



The gallery consists of 12 promotional cards for Ranigast, arranged in a 2x6 grid. Each card features the Ranigast logo and 'FAMOTYDYNA' text. The cards highlight various aspects of the product:

- Card 1:** Shows the product box for Famotydyna Ranigast 20mg tablets.
- Card 2:** 'LEK POLECANEJ MARKI NA ZGAGĘ I NIESTRAWNOŚĆ' (Lecak recommended brand for heartburn and indigestion).
- Card 3:** 'JEDYNY TAKI LEK, KTÓRY DZIAŁA SZYBKO I DŁUUUGO' (The only medicine that acts quickly and for a long time).
- Card 4:** 'ZALETY FAMOTYDYZNY' (Benefits of famotidine), listing it as a strong H2 blocker and a stomach acid inhibitor.
- Card 5:** 'MAŁA TABLETKA zaledwie 6mm średnicy' (Small tablet, only 6mm diameter).
- Card 6:** 'MARKA NR 1 W ŚWIADOMOŚCI OSÓB CIĘPIĄCYCH NA ZGAGĘ' (Brand No. 1 in the awareness of people suffering from heartburn).
- Card 7:** 'POZNAJ INNE PRODUKTY Z RODZINY RANIGAST' (Discover other products from the Ranigast family), showing Ranigast SOS Mleczko and Ranigast SOS.
- Card 8:** 'Zalety ranigast' (Benefits of ranigast), mentioning it is a prescription-free medicine and effective against heartburn.