

# Famotydyne Ranigast 20 mg x 30 tabl. powl.

Cena: 25,50 zł



## Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Famotidinum

## Opis produktu

### Wstęp

Famotydyne Ranigast zawiera należącą do grupy leków nazywanych antagonistami receptora H<sub>2</sub> famotydyne, która hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność.

Działanie leku utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

### Skład:

Substancja czynna leku: famotydyne. Każda tabletkę zawiera 20 mg famotydyny.

Pozostałe składniki leku:

Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogoł 6000, talk, lak z czerwieni koszenilową (E124)

### Wskazania:

Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność.

### Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### Dorośli:

W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki).  
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.  
Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Ze względu na to, że lek jest wydalany głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż może okazać się konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 godzin. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  
Zaobserwowano nadwrażliwość krzyżową w tej grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty z grupy antagonistów receptorów H<sub>2</sub> w wywiadzie.  
Niewydolność nerek.

**Przechowywanie:**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze do 25°C.

**Opakowanie:** 30 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Składniki**

Famotidine

**Stosowanie**

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza  
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Producent**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

**Opis**

Famotydyna Ranigast 20 mg x 30 tabl. powl.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.