

## Flegamax Forte 2,7 g x 6 sasz.



Cena: 29,40 zł

### Opis słownikowy

Dawka	2,7 g/sasz.
Opakowanie	6 sasz.
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum

### Opis produktu

#### Wstęp

Granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce wskazany do stosowania w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

#### Skład:

Każda saszetka zawiera 2700 mg karbocysteiny z lizyną co odpowiada 1500 mg karbocysteiny.  
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: aspartam. Każda saszetka zawiera 30 mg aspartamu.

#### Wskazania:

Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

#### Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka raz na dobę (2700 mg karbocysteiny z lizyną).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek: brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny u osób z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek.

#### Sposób podawania:

Zalecaną dawkę rozpuścić w pół szklanki wody, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić.

Po rozpuszczeniu granulatu powstaje biało-żółtawy roztwór o pomarańczowym zapachu.

Przygotowany roztwór należy przyjąć bezpośrednio po sporządzeniu.

#### Dodatkowe informacje:

Nie należy stosować produktu przed snem.  
Dawkę przyjąć nie później niż 4 godziny przed snem.  
Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas leczenia.  
Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.  
Stan astmatyczny.  
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Opakowanie:** 6 saszetek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 26364

Podmiot odpowiedzialny  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

**Składniki**

Carbocysteine

**Stosowanie**

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza  
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**Przeciwwskazania**

Ze względu na to, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, produkt należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić się nad kontynuacją leczenia tym produktem, a także zweryfikować diagnozę i zastosować inne leki, np. antybiotyki. Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia karbocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie karbocysteiny. Karbocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi podczas leczenia fizykoterapii oddechowej. Produkt leczniczy zawiera 30 mg aspartamu w każdej saszetce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Brak klinicznych i nieklinicznych danych dotyczących stosowania aspartamu u niemowląt poniżej 12. tygodnia życia.

**Producent**

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

**Opis**

Flegamax Forte 2,7 g x 6 sasz.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

