

Gargarin proszek, 30 g

Cena: 7,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 g (słoik)
Postać	pr.do sporządz.płynu do płuk.g
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony

Opis produktu

Lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym wskazany do stosowania pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Skład:
5 g proszku zawiera: 1,74 g sodu tetraboranu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g mentolu

Dawkowanie:
Preparat do stosowania miejscowego.
Jedną łyżeczkę proszku (5 g) rozpuść w szklance ciepłej wody.
Przepłukiwać gardło roztworem 2-3 razy na dobę. Nie połykać.
Jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach stosowania lub się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników oraz na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie długotrwale lub na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może spowodować kumulowanie boraksu w organizmie i wywołać zatrucie.
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią stosować tylko w porozumieniu z lekarzem lub farmaceutą.

Opakowanie: 50 g

Podmiot odpowiedzialny
Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44
30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.