

Hirudoid żel 0,3g/100g, 40 g



Cena: 29,60 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,3 g/100g
Opakowanie	40 g
Postać	Żel
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Heparinoidum

Opis produktu

Hirudoid® to lek w postaci żelu, którego główny składnik polisarczan mukopolisacharydowy wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i regeneracyjne.

Dzięki zawartości polisarczanu mukopolisacharydowego żel zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchniowych, stymuluje ich wchłanianie, wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Przyczynia się do regeneracji struktur tkankowych.

Wskazania:

Do stosowania miejscowego na skórę w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków, zapalenia żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Dawkowanie:

Nakładać 1-3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub jeśli zachodzi potrzeba, częściej.

W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści/żelu.

Hirudoid® w postaci maści/żelu należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na polisarczan mukopolisacharydowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy nakładać żelu na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Opakowanie: 40 g

Podmiot odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel
Niemcy

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.