

Ibuprofen APTEO MED żel 50mg/g, 50 g (tub.)



Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 mg/g
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Bezbarwny lub lekko żółty, przezroczysty, jednorodny żel o miętowym zapachu (pH 6,7-7,4) wskazany do stosowania w miejscowym, objawowym leczeniu bólu mięśni.

Wskazania:

Miejscowe, objawowe leczenie bólu mięśni spowodowanego niewielkimi siniakami, uderzeniami lub nadwyrężeniami, sztywnością karku, lub innymi przykurczami, lekkimi skręceniami oraz bólu dolnej części pleców u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Składniki:

Każdy gram żelu Ibuprofen APTEO MED zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Zalecana dawka to 50 do 125 mg ibuprofenu, co odpowiada paskowi żelu o długości 4 do 10 cm, który należy nanieść na skórę w obrębie bolesnego miejsca i delikatnie wmasować aż do całkowitego wchłonięcia. Żel należy stosować maksymalnie 4 razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Ibuprofen APTEO MED u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób użycia:

Podanie na skórę.

Po każdym nałożeniu produktu należy dokładnie umyć ręce.

Leczenie należy zweryfikować po 7 dniach (5 dni u młodzieży), zwłaszcza gdy objawy utrzymują się lub nasilają.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Stosowanie na uszkodzonej lub chorobowo zmienionej skórze.

Środki ostrożności:

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Nie stosować pod opatrunkami okluzyjnymi.
Należy unikać ekspozycji leczonych miejsc na działanie słońca.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w tym samym miejscu na skórze.
Należy unikać stosowania produktu leczniczego Ibuprofen APTEO MED przez dłuższy czas lub na dużą powierzchnię skóry.
Produkt leczniczy Ibuprofen APTEO MED może być stosowany wyłącznie na nieuszkodzoną, niezmienną chorobowo skórę, a nie może być stosowany na zranioną skórę i otwarte rany.
Produkt leczniczy nie może mieć kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i nie nadaje się do spożycia.
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni (5 dni u młodzieży), należy ocenić stan kliniczny pacjenta.
Dzieci
Produkt leczniczy Ibuprofen APTEO MED nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci (w wieku poniżej 12 lat).
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Ibuprofen APTEO MED nie została określona u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Opakowanie: 50 g

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.