

Laremid 2 mg x 10 tabl.

Cena: 12,20 zł



Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	10 tabl. (blis.)
Postać	tabl.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

Wstęp

Składniki

Loperamide

Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Leczenie biegunki produktem Loperamid WZF jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. Najważniejsze przy ostrej biegunce jest zapobieganie lub przywrócenie utraconych płynów i elektrolitów. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, pacjentów osłabionych oraz osób w podeszłym wieku z ostrą biegunką. Podczas stosowania tego produktu zaleca się podawanie odpowiednich ilości płynów i elektrolitów. Ponieważ długotrwała biegunka może być objawem poważniejszych chorób, nie należy stosować loperamidu długotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona. Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Loperamid WZF należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki loperamidem, należy przerwać podawanie produktu przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha. Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach zaparć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy podczas stosowania loperamidu u pacjentów z AIDS z zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez bakterie jak i wirusy. Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności

wątroby, w tej grupie pacjentów produkt Loperamid WZF należy stosować z ostrożnością z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do względnego przedawkowania leku, prowadzącego do toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli pacjent stosuje ten produkt w celu kontroli epizodów biegunki związanej ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego i w ciągu 48 godzin nie występuje poprawa kliniczna, produkt należy odstawić i skonsultować się z lekarzem. Pacjenci powinni również skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy ulegną zmianie lub jeśli nawracające epizody biegunki trwają dłużej niż dwa tygodnie. W związku z przedawkowaniem zgłaszano przypadki wystąpienia zdarzeń kardiologicznych, w tym wydłużenia odstępu QT oraz czasu trwania zespołu QRS, a także zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. W niektórych przypadkach nastąpił zgon. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani zalecanego czasu trwania leczenia. Przedawkowanie może prowadzić do ujawnienia istniejącego zespołu Brugadów. Ze względu na zawartość laktozy, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Laremid 2 mg x 10 tabl.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



LAREMID
Loperamid hydrochloridum 2 mg tabletki
LEK
LEK PRZECIBIEGUNKOWY
przecieczny (do stosowania doraźnego)
10 tabletek

LAREMID **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKIE
NA BIEGUNKĘ**



Działa w ciągu godziny po podaniu z tabletek*

*Laremid Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 29.08.2013 r

LAREMID **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKIE
NA BIEGUNKĘ**



- Hartuje perystaltykę jelit
- Zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżnienia
- Zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów

LAREMID **LEK**

DAWKOWANIE

DOROŚLI:
początkowo 2 tabletki (4 mg),
a następnie po 1 tablecie
po każdym wolnym stolcu.

DZIECI od 6. roku życia:
początkowo 1 tabletkę,
a następnie 1 tabletkę po każdym
wolnym stolcu.

LAREMID **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKIE
NA BIEGUNKĘ**



4,8 / 5
Średnia ocena użytkowników na ceneapi!

* Średnia ze 189 opinii dostępnych w serwisie Ceneapi, stan na dzień 28.11.2022.
źródło: <https://www.ceneapi.pl/6776920/loperamid>