


Mukolina Syrop 120 ml



Cena: 16,30 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

upłynnia wydzielinę dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie i zmniejsza częstość napadów kaszlu

Stosowanie

Syrop należy przyjmować po posiłkach.
Nie należy zażywać leku przed snem.

Dalsze informacje - patrz ulotka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

Wiek Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie Początkowo 750 mg (15 ml syropu) 3 razy na dobę, a następnie po uzyskaniu korzystnego działania (rozrzedzenie wydzieliny, ułatwienie odkrztuszania) 500 mg (10 ml syropu) 3 razy na dobę.
Wiek Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat / Dawkowanie 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę. Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

120

Opis

Mukolina Syrop 120 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.