

NIZORAL szampon leczniczy 20 mg/g, 6 sasz.. po 6 ml

Cena: 29,21 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	6 sasz. po 6 ml
Postać	szamp.leczn.
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ketoconazolum

Opis produktu

Preparat w postaci szamponu leczniczego przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę zawierający 20 mg ketokonazolu.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy wskazany w leczeniu i profilaktyce chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (wcześniej nazywane *Pityrosporum*):

- łupieżu owłosionej skóry głowy,
- łojotokowego zapalenia skóry,
- łupieżu pstrego (wywołanego przez *Pityriasis versicolor*).

Ketokonazol działa silnie przeciwgrzybiczo na dermatofity, takie jak: *Trichophyton* spp., *Epidermophyton* spp., *Microsporum* spp. i drożdżaki, jak: *Candida* spp. i *Malassezia* spp. (*Pityrosporum* spp.). Zmniejsza łuszczenie się i świąd towarzyszące łojotokowemu zapaleniu skóry, łupieżowi skóry głowy i łupieżowi pstremu.

Dawkowanie i sposób podawania:

Lek NIZORAL®, szampon leczniczy stosuje się u młodzieży (powyżej 12 lat) oraz osób dorosłych.

Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy należy umyć szamponem leczniczym NIZORAL® i pozostawić go na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.

Zazwyczaj 1 saszetka lub garść szamponu wystarcza do jednorazowego zastosowania.

Leczenie:

Łupież pstry: stosować raz na dobę przez jeden dzień.

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Profilaktyka:

Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego NIZORAL®, szampon leczniczy u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało ustalone.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację:

W okresie ciąży i karmienia piersią szampon leczniczy NIZORAL® można stosować w zdecydowanej konieczności, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Opakowanie: 6 saszetek po 6 ml szamponu leczniczego

Podmiot odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Niemcy

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.