

Opatrunek Atrauman Ag z maścią 10x10cm, 1 szt.

Cena: 15,76 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | Emplastry antimicrobiotica |

Opis produktu

Opatrunek Atrauman® Ag z nieprzywierającą warstwą kontaktową impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych ani parafiny, którego materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym.

Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go atraumatycznie zmieniać. Ponadto jest miękki, cienki i łatwy do układania, co zapewnia dobry kontakt z podłożem rany.

Atrauman® Ag działa jak opatrunek barierowy z maścią, która chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji.

Zastosowanie:

W leczeniu ran przewlekłych, takich jak odleżyny, owrzodzenie żyłne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej. Odpowiedni także do leczenia ostrych oparzeń maksymalnie II stopnia.

Właściwości:

- Impregnowany maścią zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany.
- Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany.
- W celu pochłaniania wydzieliny z rany należy na opatrunku Atrauman® Ag zastosować odpowiedni jałowy opatrunek wtórny (opatrunek chłonny lub superabsorbpcyjny jak np. Zetuvit® Plus) zgodnie z jego instrukcją stosowania.
- Skuteczność opatrunku barierowego utrzymuje się maksymalnie przez 7 dni.
- Opatrunek powinien być zmieniany podczas każdej zmiany opatrunku. Czas użycia opatrunku nie powinien przekraczać 7 dni.
- Jałowy.

Rozmiar: 10 x 10 cm

Opakowanie: 1 szt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.