

Orofar Max Pastyłki twarde smak miętowy 30 sztuk

Cena: 34,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	2mg+1mg
Opakowanie	30 pastyl.
Postać	pastyl.twarde
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetylpirydinium, Lidocainum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

szybko zwalcza ból gardła, działa już w 2 minuty, działa na bakterie, wirusy i grzyby, nie zawiera cukru, łagodzi ból gardła do 4 godzin

Składniki

jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol, Lek zawiera sorbitol (1,107 g/pastylkę)

Stosowanie

Sposób stosowania: doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować leku Orofar Max podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Nie należy stosować leku Orofar Max w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku. Nie należy stosować leku Orofar Max u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Orofar Max. Stosować ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami i ranami błony śluzowej jamy ustnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Stada Pharm Sp. z o.o.

Opis

Orofar Max Pastyłki twarde smak miętowy 30 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

