

Panadol Extra 500 mg + 65 mg Tabletki powlekane 24 sztuki

Cena: 20,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,065g
Opakowanie	24 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Coffeinum

Opis produktu

Wstęp

Panadol Extra to lek zawierający dwie substancje czynne: paracetamol i kofeinę, którego działanie lecznicze wynika ze skojarzonego działania substancji czynnych.

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Wskazania:

Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bólach menstruacyjnych.

Może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

Działa przeciwgorączkowo.

Dawkowanie:

Lek do podania doustnego.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, w zależności od nasilenia dolegliwości, 1-2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 dawki (8 tabletek) w ciągu doby. Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez najkrótszy możliwy czas.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
Jeśli pacjent ma wrażenie że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci: nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania:

Leku Panadol Extra nie należy przyjmować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, zaburzeń rytmu serca, bezsenności
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Składniki:

Substancje czynne: paracetamol i kofeina. Każda tabletką powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, powidon (K 25), potasu sorbinian, talk, kwas stearynowy, kroscarmeloza sodowa.

Otoczka zawiera: hydroksypropylometylcelulozę, triacetynę.

Opakowanie: 24 tabletki powlekane

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Wskazania

lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy w tabletkach, odpowiedni w przypadku bólu głowy i migreny, a także bólu gardła, zębów, kości, stawów i mięśni, może być stosowany również w przypadku silnego bólu menstruacyjnego

Składniki

1 tabletką zawiera jako substancje czynne 500 mg paracetamolu, 65 mg kofeiny oraz substancje pomocnicze, w tym potas i sód - szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta

Stosowanie

Dawkowanie:

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, w zależności od nasilenia dolegliwości, 1-2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie przyjmować leku częściej, niż co 4 godziny, nie stosować więcej niż 4 dawki (8 tabletek) w ciągu doby. Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeżeli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

Lek zawiera paracetamol.

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Opis

Panadol Extra 500 mg + 65 mg Tabletki powlekane 24 sztuki

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

