

# Panadol Sprint Tabletki 12 sztuk



Cena: 6,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	12 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

## Opis produktu

### Wstęp

### Wskazania

specjalny skład, szybkie uwalnianie, działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

### Składniki

1 tabletkę powlekaną zawiera 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze

### Stosowanie

#### Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): Doustnie 1-2 tabletki.

W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-11 lat: Doustnie ½-1 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godz. podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować częściej niż co 4 godziny. Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Wyłącznie do stosowania doustnego.

### Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

### Przeciwwskazania

Zawiera paracetamol. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W przypadku przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne działania niepożądane, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Skład: 1 tabletkę powlekana zawiera 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

Haleon Poland sp. z o.o.

**Ważne**

Nr pozwolenia: 21347

**Opis**

Panadol Sprint Tabletki 12 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.