

# Paracetamol Synoptis tabletki 500 mg, 20 tbl



Cena: 5,50 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

## Opis produktu

Paracetamol Synoptis - lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy przeznaczony do podawania doustnego u osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i dzieci w wieku od 12 lat.

### Wskazania do stosowania:

- Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych
- Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach

### Skład:

Substancja czynna leku: paracetamol – 500 mg/tabletkę.

Substancje pomocnicze: powidon K30, skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy (typ 50).

### Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg):

doustnie 500 mg – 1000 mg paracetamolu (1 lub 2 tabletki), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

### Maksymalna dawka dobową:

- przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) – 4000 mg paracetamolu (8 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych;
- przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) – 2500 mg paracetamolu (5 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

### Zaburzenia czynności wątroby:

W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub zespołu Gilberta dawkę leku należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi

dawkami.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Choroba alkoholowa.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane, nie częściej niż co 4 godziny ani dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Lek stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną.

Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W okresie stosowania paracetamolu nie pić napojów alkoholowych.

Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

OTC - produkt leczniczy dostępny bez recepty

**Opakowanie:** 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny  
Synoptis Pharma Sp. z o.o.  
ul. Krakowiaków 65  
02-255 Warszawa

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**