

Pedicetamol roztwór doustny 100 mg/ml, 30 ml

Cena: 23,00 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	roztw.doust.
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Pedicetamol® to lek stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Zawiera paracetamol, należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Jeśli po przyjęciu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, gorączka nie ustąpi po 3 dniach lub jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach u dzieci lub 5 dniach u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła), należy zwrócić się do lekarza.

Skład:

Substancją czynną leku jest: paracetamol.

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Inne składniki leku to: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzyłowy), sacharyna sodowa, azorubina (E122).

Sposób użycia:

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml) roztworu doustnego.

Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

U dzieci w wieku poniżej 3 lat: zaleca się podawanie roztworu za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.

U dzieci w wieku od 3 lat: zaleca się podawanie roztworu za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Jeżeli pożądanego działania nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku odpowiednią dawkę należy wyliczyć zgodnie z poniższą instrukcją:

masa ciała dziecka w kilogramach (kg) \times 0,1 \times dawka leku Pedicetamol® w mililitrach (ml)

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Opakowanie: 30 ml

Podmiot odpowiedzialny:
"Polski Lek-Dystrybucja" Sp. z o.o.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.