

# Pedicetamol roztwór doustny 100 mg/ml, 60 ml



Cena: 28,98 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/ml
Opakowanie	60 ml
Postać	rozt.doust.
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

## Opis produktu

Pedicetamol® to lek stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Zawiera paracetamol, należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Jeśli po przyjęciu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, gorączka nie ustąpi po 3 dniach lub jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach u dzieci lub 5 dniach u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła), należy zwrócić się do lekarza.

### Skład:

Substancją czynną leku: paracetamol. 1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Inne składniki leku: makroglol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (E122).

### Sposób użycia:

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml) roztworu doustnego.

### Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

U dzieci w wieku poniżej 3 lat: zaleca się podawanie roztworu za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.

U dzieci w wieku od 3 lat: zaleca się podawanie roztworu za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku odpowiednią dawkę należy wyliczyć zgodnie z poniższą instrukcją:

*masa ciała dziecka w kilogramach (kg) x 0,1 × dawka leku Pedicetamol® w mililitrach (ml)*

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

**Opakowanie:** 60 ml

Podmiot odpowiedzialny:  
"Polski Lek-Dystrybucja" Sp. z o.o.  
ul. Chopina 10  
34-100 Wadowice

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.