

# Pirolam Intima Vag 500 mg x1 tabletki dopochwowa

Cena: 31,90 zł



## Opis słownikowy

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dawka             | 500 mg                              |
| Opakowanie        | 1 tabl.                             |
| Postać            | tabl.dopoch.                        |
| Producent         | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Rejestracja       | Lek                                 |
| Substancja czynna | Clotrimazolum                       |

## Opis produktu

### Wstęp

### Składniki

Clotrimazole

### Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Przeciwwskazania

Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku gdy do zakażenia doszło po raz pierwszy, zakażenia pochwy w pierwszym tryestrze ciąży, gdy wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku, gorączki ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ), bólu w dolnej części brzucha, bólu pleców, cuchnących upławów, nudności, krwawienia z pochwy i (lub) bólu w ramionach. Nie należy stosować produktu leczniczego Pirolam Intima Vag w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego. Tampony, płukanie pochwy, środki plemnikobójcze lub inne produkty do stosowania dopochwowego nie powinny być stosowane jednocześnie z tym produktem leczniczym. Podczas stosowania produktu leczniczego Pirolam Intima Vag należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego. Partner seksualny również powinien zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny. Leczenie partnerów seksualnych może pomóc w zapobieganiu ponownej infekcji. Niezawodność i skuteczność antykoncepcyjna środków antykoncepcyjnych, takich jak lateksowe prezerwatywy i krążki dopochwowe, może być zmniejszona. Tabletek nie należy połykać.

### Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

### Opis

Pirolam Intima Vag 500 mg x1 tabletka dopochwowa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Galeria

