

Polprazol Max 20 mg x 14 kaps.

Cena: 18,90 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 20 mg |
| Opakowanie | 14 kaps. (blist.) |
| Postać | kaps.dojel.twarde |
| Producent | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Omeprazol |

Opis produktu

Wstęp

Składniki

Omeprazole

Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania

W przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów (np. istotnego niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, utrudnienia połykania, wymiotów krwistych lub smolistych stolców), a także w przypadku podejrzenia lub obecności owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć obecność zmian nowotworowych, ponieważ leczenie produktem Polprazol Max może łagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie. Nie zaleca się jednoczesnego podawania atazanawiru oraz inhibitorów pompy protonowej. W przypadku, gdy stosowanie łączne atazanawiru oraz inhibitora pompy protonowej jest uznane za nieuniknione zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ocena miana wirusów) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg z dawką rytonawiru 100 mg. Nie należy stosować dawki omeprazolu większej niż 20 mg. Omeprazol jest inhibitorem enzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia omeprazolem należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez enzym CYP2C19. Obserwuje się interakcję pomiędzy kłopidogrelem i omeprazolem. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest pewne. Jednak nie zaleca się równoczesnego stosowania omeprazolu oraz kłopidogrelu. Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych. Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy przerwać leczenie produktem Polprazol Max na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA. Jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. Pacjenci z długotrwanie występującymi, nawracającymi objawami niestrawności lub zgagą powinni zgłaszać się do lekarza w regularnych odstępach czasu. Szczególnie pacjenci w wieku powyżej 55 lat przyjmujący jakiegokolwiek wydawane bez recepty leki na niestrawność lub zgagę powinni poinformować o tym farmaceutę lub lekarza. Pacjentów należy pouczyć, aby skonsultowali się z lekarzem, jeżeli: mieli wcześniej owrzodzenie żołądka lub zabieg chirurgiczny przewodu pokarmowego; przyjmują w sposób ciągły leki na niestrawność lub zgagę przez 4 tygodnie lub dłużej; mają żółtaczkę lub ciężką chorobę wątroby; są w wieku ponad 55 lat i występują u nich nowe objawy lub objawy, które w ostatnim czasie uległy zmianie. Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo. Hipomagnezemia. U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki występowania ciężkiej hipomagnezemia. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemia, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej. U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub lekami mogącymi wywołać hipomagnezemia (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia. Podostra postać skórna tocznia rumieniowatego (SCLE). Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE. Jeśli pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, a lekarz powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania produktu Polprazol Max. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko SCLE w wyniku leczenia innymi inhibitorami pompy protonowej. Zaburzenia czynności nerek. U pacjentów przyjmujących omeprazol zaobserwowano ostre zapalenie cewkowo-śródmiąższowe nerek (TIN, ang. tubulointerstitial nephritis), mogące wystąpić w dowolnym momencie w trakcie terapii omeprazolem (patrz punkt 4.8). Ostre zapalenie cewkowo-śródmiąższowe nerek może prowadzić do niewydolności nerek. Jeśli u pacjenta podejrzewa się TIN, należy przerwać stosowanie omeprazolu i niezwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie. Produkt leczniczy zawiera sacharozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ten produkt zawiera 0,819 mg (0,036 mmol) sodu, mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”. Polprazol Max zawiera erytrozynę (E127) – może powodować reakcje alergiczne.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Polprazol Max 20 mg x 14 kaps.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



LEK

PROFESJONALNA POMOC NA SILNĄ ZGAGĘ¹

Polprazol MAX łagodzi objawy silnej zgagi i refluksu żołądkowo - przełykowego²

**Pieczenie w przełyku
Pałący ból w nadbrzuszu
Cofanie treści żołądkowej**



¹ Omeprazol (substancja czynna leku Polprazol MAX) należy do inhibitorów pompy protonowej - grupy leków o wyjątkowo silnym i trwałym działaniu na silny objawowy refluks żołądkowo-przełykowy. [Dębowska A, Łacina chOROBY WŁADYSLAWA PRZYBYLO, Medycyna w Dobrym Czasie 2016; 14(4)].
² ChR, Polprazol MAX
³ Zgodnie z wytycznymi leczenia zgagi i refluksu żołądkowo-przełykowego [Dębowska A, Łacina chOROBY WŁADYSLAWA PRZYBYLO, Medycyna w Dobrym Czasie 2016; 14(4)].
⁴ 20 mg to najwyższe dawki omeprazolu w stosowanych na rynku lekach bez recepty w dawce 20 mg 14 dni.

LEK

PROFESJONALNA POMOC NA SILNĄ ZGAGĘ¹

Jedna kapsułka działa aż 24h²

Nawet 3 miesiące bez zgagi³

Silnie hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku⁴

Zawiera największą ilość substancji czynnej w kapsułce⁴

¹ Omeprazol (substancja czynna leku Polprazol MAX) należy do inhibitorów pompy protonowej - grupy leków o wyjątkowo silnym i trwałym działaniu na silny objawowy refluks żołądkowo-przełykowy. [Dębowska A, Łacina chOROBY WŁADYSLAWA PRZYBYLO, Medycyna w Dobrym Czasie 2016; 14(4)].
² ChR, Polprazol MAX
³ Zgodnie z wytycznymi leczenia zgagi i refluksu żołądkowo-przełykowego [Dębowska A, Łacina chOROBY WŁADYSLAWA PRZYBYLO, Medycyna w Dobrym Czasie 2016; 14(4)].
⁴ 20 mg to najwyższe dawki omeprazolu w stosowanych na rynku lekach bez recepty w dawce 20 mg 14 dni.

LEK

DAWKOWANIE¹

Jedna kapsułka na dobę

Zaleca się przyjmowanie rano, 30-60 min. przed 1. posiłkiem

14 dni Stosowany przez 14 dni pozwala zapobiec wystąpieniu zgagi nawet przez 3 miesiące²

¹ ChR, Polprazol MAX
² Zgodnie z wytycznymi leczenia zgagi i refluksu żołądkowo-przełykowego [Dębowska A, Łacina chOROBY WŁADYSLAWA PRZYBYLO, Medycyna w Dobrym Czasie 2016; 14(4)].

LEK

WYSOKA JAKOŚĆ POLPRAZOL MAX

- ponad 30 lat doświadczeń terapeutycznych na świecie z wykorzystaniem omeprazolu
- najdokładniej przebadany i opisany w literaturze medycznej inhibitor pompy protonowej¹
- systematyczna ocena bezpieczeństwa omeprazolu po wprowadzeniu do obrotu²
- możliwość stosowania w szczególnych grupach pacjentów: u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia dziecka piersią, u pacjentów w wieku podeszłym, u pacjentów z niewydolnością nerek³

¹ Lista publikacji i referencji w wyszukiwarce PubMed (24.03.2022): omeprazol - 12868, lansoprazol - 8522, pantoprazol - 1234.
² Ocena raporty o bezpieczeństwie (PSR) oraz dane z badań klinicznych J. Lu, M. Li, et al. World Gastroenterology Group.
³ Comparison of clinical safety data of the antireflux surgery or omeprazole maintenance therapy for reflux esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 7(12):1282-8.
⁴ ChR, Polprazol MAX

LEK

KONTROLUJ ZGAGĘ Z POLPRAZOLEM MAX

4.8/5

Srednia ocena użytkowników Ceneo.pl*

*Opinia z 2021 opinii dostępnych w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 21.07.2022. Źródło: <https://www.ceneo.pl/62602328.aspx?view=reviews>

POL-AD-1958/06/2022