

Scaldex maść 25 g



Cena: 53,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 g
Postać	Maść
Producent	OWOC OINTMENT S.C.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum

Opis produktu

Wstęp

Lek Scaldex to maść będąca połączeniem substancji pochodzenia naturalnego, antybiotyku o szerokim zakresie działania i witaminy A. Synergiczne działanie kilku substancji czynnych zawartych w wyciągu z propolisu, nalewki z nagietka i bacytracyny decyduje o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych leku. Lek działa odkażająco, przyczynia się do szybszego oczyszczania ran z produktów przemiany materii i elementów martwiczych. Witamina A przyspiesza procesy odnowy uszkodzonej tkanki.

Wskazania:

Produkt przeznaczony do stosowania w leczeniu:

- oparzeń termicznych I i II stopnia,
- lekkich odmrożeń I i II stopnia,
- odleżyn I i II stopnia,
- trudno gojących się płytkich ran,
- zropień drobnych ran.

Skład:

Substancje czynne leku: nalewka z kwiatów nagietka *Calendula officinalis* L. flos (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny - etanol 70% (V/V) (*Calendulae tinctura*), wyciąg z propolisu (*Propolis extractum*), bacytracyna (*Bacitracinum*), witamina A syntetyczna, koncentrat olejowy (*Vitaminum A syntheticum densatum oleosum*) (witamina A stabilizowana tokoferolem, 1 g zawiera: witamina A – 990 mg, α -tokoferol – 10 mg).

1 g maści Scaldex zawiera: 90 mg nalewki z kwiatów nagietka; 30 mg wyciągu z propolisu; 10 mg bacytracyny; 0,3 mg witaminy A syntetycznej, koncentrat olejowy.

Pozostałe składniki: olej lniany pierwszego tłoczenia, cholesterol, parafina stała, wazelina biała, lanolina.

Dawkowanie:

Lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę, na niewielkiej powierzchni skóry.

Lek Scaldex jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Może być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12

lat wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka u młodzieży w wieku powyżej 12 lat i dorosłych:

W pierwszych dniach leczenia maść należy nanosić na powierzchnię rany co 2-3 godziny.

W kolejnych dniach leczenia stosować 3 razy na dobę.

W przypadku towarzyszącej wydzieliny ropnej, dodatkowo przemywać dwa razy dziennie 0,1% roztworem manganianu (VII) potasu.

Nie stosować w opatrunkach zapobiegających dostępowi powietrza, zwanych okluzyjnymi lub zamkniętymi.

Lek Scaldex należy stosować przez okres nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

Jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae), np. bylicę, jeżówkę, rumianek;

Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek;

W oparzeniach III i IV stopnia, oraz na rany głębokie i rozległe.

Środki ostrożności:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Scaldex zawiera lanolinę - może powodować miejscowe reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry, objawiające się zaczerwienieniem, świądem, powstawaniem pęcherzyków).

Opakowanie: 25g

Podmiot odpowiedzialny

Barbara Maria Owoc wspólnik spółki cywilnej Owoc Ointment

Dorian Jacek Owoc wspólnik spółki cywilnej Owoc Ointment

ul. Adama Asnyka 4

36-200 Brzozów

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.