

Silderos tabletki powlekane 25 mg APTEO, 2 tbl



Cena: 14,16 zł

Opis słownikowy

Dawka	25 mg
Opakowanie	2 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum

Opis produktu

Wstęp

Produkt leczniczy wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

W celu skutecznego działania produktu leczniczego SILDEROS niezbędna jest stymulacja seksualna.

Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn, zwanych także impotencją.

Skład:

Każda tabletki powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu syldenafilu (Sildenafilum citratum).

Dawkowanie:

Przed zażyciem leku należy skorzystać z dołączonego do opakowania testu diagnostycznego zawartego w ulotce dołączonej do opakowania.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Leku SILDEROS nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować tabletek powlekanych SILDEROS jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np. Viagra, Maxon, Mensil, Maxigra, Inventum, itp.).

Lek SILDEROS powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek SILDEROS umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu tego leku nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przeciwwskazania:

Leku SILDEROS nie należy przyjmować:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków z tej grupy należy poinformować o tym lekarza. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej (lub "ból w klatce piersiowej).
- Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotyn amylu (tzw. poppers), ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
- Jeśli pacjent stosuje riociguat - lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak SILDEROS, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riociguat lub nie jest pewien należy poinformować o tym lekarza.
- Jeśli pacjent przeżył niedawno udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub wątroby.
- Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki tj. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (*retinitis pigmentosa*)
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. *non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy*, NAION)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku SILDEROS należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- Dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na wysiłek związany z aktywnością seksualną.
- Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
- Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (takich jak hemofilia).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub stwierdzono chorobę Peyroniego.
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Opakowanie: 2 tabletki powlekane

Podmiot odpowiedzialny:
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.