

# Strepsils Intensive Tabletki do ssania 16 sztuk

Cena: 27,90 zł



## Opis słownikowy

Dawka	8,75 mg
Opakowanie	16 tabl. (2 blist. po 8 tabl.)
Postać	tabl.do ssania
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Flurbiprofenum

## Opis produktu

### Wstęp

### Składniki

Jedna tabletki do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu oraz syrop sacharozowy, syrop glukozowy, makrogl 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, miód

### Stosowanie

Podanie doustne.

Dawkowanie i sposób stosowania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletki należy ssać powoli. Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia. Jeśli po 3 dniach objawy bólu nie przemijają lub nasilają się, a także jeśli wystąpią nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

### Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- astmy oskrzelowej, zaburzeń czynności wątroby, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, niewydolności nerek, chorób serca, nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń krzepnięcia krwi;
- przyjmowania innych leków przeciwbólowych, zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych NLPZ;
- ciąży lub karmienia piersią;
- cukrzycy (każda tabletki do ssania zawiera 2,5 g węglowodanów, co odpowiada około 0,25 jednostki chlebowej).

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.  
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Producent**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

**Opis**

Strepsils Intensive Tabletki do ssania 16 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.