

Supremin Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 200 ml



Cena: 23,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	4 mg/5ml
Opakowanie	1 but. po 200 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Butamiratum

Opis produktu

Wstęp

Składniki

5 ml (1 łyżeczka miarowa) syropu zawiera jako substancję czynną 4 mg butamiratu cytrynianu, Substancje pomocnicze: kwas benzoesowy, metylu parahydroksybenzoesan, aspartam, maltitol ciekły i inne

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podawania:

Podanie doustne.

Lek należy zażywać przed posiłkiem.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

Wiek Dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Dawkowanie 1 łyżeczka miarowa (4 mg) 3 razy na dobę

Wiek Dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Dawkowanie 2 łyżeczki miarowe (8 mg) 3 razy na dobę

Wiek Dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 3 łyżeczki miarowe (12 mg) 3 razy na dobę

Wiek Dorośli / Dawkowanie 3 łyżeczki miarowe (12 mg) 4 razy na dobę

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Termin ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

200

Opis

Supremin Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 200 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.