

Supremin Max Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml



Cena: 39,60 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	1 but. po 150 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Butamiratum

Opis produktu

Wstęp

Składniki

Zawartość substancji czynnej: Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu, Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły niekryształizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podania:

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiająca dawkowanie.

Podanie doustne.

Wiek Dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Dawkowanie 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę

Wiek Dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Dawkowanie 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę

Wiek Młodzież w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę

Wiek Dorośli / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu: 2 lata, lecz nie dłużej niż termin ważności zamieszczony na opakowaniu.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Produktu leczniczego Supremin Max 1.5 mg/ml, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

150

Opis

Supremin Max Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.