

Theraflu Zatoki 650 mg + 10 mg Lek wieloskładnikowy 14 sztuk



Cena: 37,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	650mg+10mg
Opakowanie	14 sasz.
Postać	prosz. do sporz. roztw. doust.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Phenylephrinum

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

udrażnia nos i zatoki, zmniejsza ból głowy, działa przeciwgorączkowo

Składniki

1 saszетка zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: 12,8 g sacharozy, żółcień pomarańczową, 42,3 mg sodu, olej sojowy oraz glukozę (składnik maltodekstryny) - szczegółowe informacje w ulotce

Stosowanie

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Droga podania: doustna

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszетки.

Nie stosować większej niż zalecana dawka.

Maksymalna dawka dobową to 4 saszетки na 24 godziny.

Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas.

Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania produkt można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

W przypadku objawów utrzymujących się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3 dni pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Zawartość jednej saszетки należy rozpuścić w 1 szklance (około 250 ml) gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania.

W razie wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Opis

Theraflu Zatoki 650 mg + 10 mg Lek wieloskładnikowy 14 sztuk

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

