

Xylometazolin aerozol do nosa 0,5 mg/ml APTEO MED, 10 ml



Cena: 8,08 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	aer.do nosa, roztw.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

Aerozol no nosa do stosowania w celu ułatwienia odpływu wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych i nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym przy przeziębieniu, katarze siennym, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok.

Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Xylometazolin Apteo Med ułatwia wziernikowanie nosa.

Skład:

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazolini chlorowodoru, co odpowiada 0,012 – 0,016 mg ksylometazolini chlorowodoru/kroplę roztworu (0,014 ± 15%). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Sposób użycia:

Produkt jest przeznaczony do stosowania do nosa.

Instrukcja stosowania:

1. Oczyszczyć nos.
2. Odkręcić zakrętkę zawierającą kroplomierz.
3. Przechylić głowę do tyłu.
4. Wpuścić krople do obu otworów nosowych i przez jakiś czas trzymać odchyloną głowę, tak aby krople rozprzestrzeniły się po całej jamie nosowej.
5. Po użyciu, końcówkę kroplomierza ostrożnie wyczyścić czystą papierową chusteczką, a następnie zakręcić butelkę.

W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia opakowanie produktu leczniczego powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Dawkowanie:

Dzieci w wieku poniżej 2 lat: nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 lub 2 krople roztworu Xylometazolin Apteo Med do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę (co 8 do 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 2 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych): 2 do 4 kropli roztworu Xylometazolin Apteo Med do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę, w razie konieczności.

Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę.
Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed snem

Produktu leczniczego Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować dłużej niż przez pięć kolejnych dni; dłuższe lub zbyt częste stosowanie może spowodować nawrót objawów i (lub) zanik błony śluzowej nosa. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Produkt leczniczy Xylometazolin Apteo Med zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ksylometazolinę chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przynosową, takich jak np. przezklinowe usunięcie przysadki, i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

Opakowanie: krople do nosa 10 ml

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.