

# Xylorin aerozol do nosa 0,55mg/ml, 18 ml



Cena: 26,80 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,55 mg/ml
Opakowanie	18 ml
Postać	aer.do nosa, roztw.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

## Opis produktu

Xylorin to lek na katar różnego pochodzenia przeznaczony do stosowania w leczeniu objawowego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Preparat zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

### Wskazania:

- leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok przynosowych
- miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego), które występuje w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych
- wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego będącego następstwem przeziębienia

### Działanie:

Aerozol na katar Xylorin działa miejscowo.

Powodując skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa tym samym udrożniając nos i umożliwiając swobodne oddychanie.

Lek zmniejsza ilości zalegającej wydzieliny.

Dzięki formie aerozolu Xylorin jest bardziej wydajny niż krople, dozownik umożliwi bardziej precyzyjne i równomierne rozpylenie roztworu.

Działa do 12 godzin.

### Składniki:

**Substancja czynna:** 1 ml roztworu zawiera substancję czynną: 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodoru

**Substancje pomocnicze:** sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona

### Dawkowanie i stosowanie:

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli – 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 10-12 godzin przez 3 do 5 dni.  
Przed podaniem leku należy: oczyścić nos, zdjąć nasadkę ochronną z butelki, butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry, końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć (w tym czasie oczy i usta powinny być zamknięte), po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Leku nie należy stosować dłużej to zalecane.

**Przeciwwskazania:**

Leku Xylorin nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku;
- nadwrażliwości na produkty adrenergiczne.
- przyjmowania inhibitorów MAO oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych;
- zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa;
- po zabiegu usunięcia przysadki;
- po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odstąpieniem opony twardej;
- jaskry z wąskim kątem przesączania.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od światła.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**Opakowanie:** 18 ml

Podmiot odpowiedzialny

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**